

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA INFLUVAC TETRA

Influvac es una vacuna antigripal compuesta por antígenos inactivados de superficie, diseñada para ofrecer protección contra las cepas de virus de la **influenza A y B** recomendadas por la OMS. Cada jeringa prellenada de 0,5 ml contiene hemaglutinina y neuraminidasa de las siguientes cepas:

- **A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09** - 15 mcg hemaglutinina por dosis
- **A/Darwin/9/2021 (H3N2)** - 15 mcg hemaglutinina por dosis
- **B/Austria/1359417/2021** - 15 mcg hemaglutinina por dosis


La vacuna se presenta en una suspensión inyectable, clara e incolora, lista para su uso. Su forma farmacéutica permite una inyección intramuscular o subcutánea profunda, proporcionando un agente inmunizante efectivo en adultos y niños mayores de 6 meses.

COMPOSICIÓN

- Cada jeringa de 0,5 ml contiene antígenos inactivados de virus de Influenza (Hemaglutinina y neuraminidasa) de cepas recomendadas por la OMS para el hemisferio sur en 2023.
- Otros componentes incluyen cloruro de potasio, fosfatos, cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, citrato de sodio, bromuro de cetiltrimetilamonio, sacarosa, formaldehído, polisorbato 80, sulfato de gentamicina, hidrocortisona, tartrato tylosina y agua para inyecciones.
- Se presenta en jeringas descartables unidosis con 0,5 ml de suspensión inyectable clara e incolora.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Profilaxis de la gripe en adultos y niños mayores de 6 meses, especialmente en personas con mayor riesgo de complicaciones.
- Recomendada para personas de 65 años o mayores, adultos y niños con enfermedades crónicas pulmonares, cardiovasculares, metabólicas, insuficiencia renal crónica o inmunodeficiencias.
- También se aconseja para niños y adolescentes (6 meses a 18 años) bajo tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.



Nota: Este medicamento debe ser utilizado bajo prescripción y vigilancia médica. Mantener fuera del alcance de los niños.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA INFLUVAC TETRA

INSTRUCCIONES DE USO

La vacuna Influvac se administra mediante inyección intramuscular o subcutánea profunda. La dosis recomendada es de 0,5 ml para adultos y niños mayores de 36 meses. Para niños de 6 a 35 meses, se pueden administrar dosis de 0,25 a 0,5 ml, aunque los datos clínicos en esta población son limitados. En el caso de niños que se vacunan por primera vez, se debe administrar una segunda dosis después de un intervalo de al menos 4 semanas.

La efectividad de la vacuna se establece generalmente dentro de un período de 2 a 3 semanas después de la administración. La duración de la inmunidad varía, pero generalmente se presenta una seroprotección efectiva durante un período de 6 a 12 meses, especialmente contra cepas homólogas o cepas estrechamente relacionadas con las cepas de la vacuna.

PRECAUCIONES

- Supervisión y tratamiento médico deben estar disponibles en caso de reacciones anafilácticas.
- No debe administrarse de manera intravascular.
- Administrar con precaución a personas con trombocitopenia o trastornos de la coagulación.

ALMACENAMIENTO

La vacuna Influvac debe ser almacenada en refrigeración, a una temperatura de entre 2°C y 8°C. Es importante asegurar que no se congele y que se mantenga en su envase original para proteger el producto de la luz. Además, se debe permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su uso y agitarla bien antes de la administración.

